



NOMBRE COMUN	Rizogen Plus		
INGREDIENTE ACTIVO	<i>Ascophyllum nodosum</i> , sustancias húmicas, zinc y cofactor de crecimiento.		
FORMULACION	Concentrado soluble (SL)		
COMPOSICION	Nitrógeno (N)	1,6% p/p	2,0% p/v
	Fósforo (P ₂ O ₅)	0,3% p/p	0,4% p/v
	Potasio (K ₂ O)	4,8% p/p	6,2% p/v
	Zinc (Zn)	1,2% p/p	1,6% p/v

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Rizogen Plus es un bioestimulante radicular, formulado en base a extracto de *Ascophyllum nodosum* (35% p/v), sustancias húmicas y zinc. Su aplicación al suelo estimula el crecimiento de raíces, aumentando la absorción de agua y nutrientes, mejora las condiciones físicoquímicas del suelo y aumenta la tolerancia al estrés hídrico, térmico y salino.

Además, **Rizogen Plus** contiene bioestimulantes de fuerte acción anti estresante, que contribuyen a estimular el crecimiento vegetativo de las plantas y un cofactor de crecimiento (0,12% p/v de AIB).

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Dosis L/ha/aplicación	Aplicaciones/temporada o ciclo de cultivo	Observaciones
Frutales de hoja caduca Vides	2 - 3	1 - 3	Aplicar desde el inicio de actividad radicular. Repetir a los 30 días y/o al siguiente <i>flush</i> radicular, si fuera necesario.
Cítricos Olivo Palto	2 - 4	1 - 4	En frutales persistentes se pueden extender las aplicaciones hasta otoño.
Plantaciones nuevas	1,5 - 3	2 - 4	Aplicar desde el inicio de actividad radicular. Repetir cada 30 a 45 días, si fuera necesario.
Hortalizas	1,5 - 3	1 - 3	Aplicar desde 15 a 20 días después del trasplante. Repetir a los 20 a 30 días, 1 o 2 veces, si fuera necesario.
Cultivos	1,5 - 3	1 - 2	Aplicar desde 2 a 5 hojas verdaderas. Repetir a los 30 días, si fuera necesario.

En frutales y vides: se recomienda verificar el inicio del *flush* de crecimiento de raíces mediante calicatas.

INSTRUCCIONES DE USO

- Agregar lentamente el producto al estanque de fertirriego y disolver en agua agitando vigorosamente. Completar el volumen de agua necesario e inyectar al riego.
- Inyectar en la última etapa del riego para dejar el producto en la zona de mayor concentración de raíces.
- Cuando no sea posible aplicar vía riego tecnificado, aplicar vía *drench*, a la base de las plantas, respetando las dosis/ha.
- En caso especiales, consultar al Depto. Técnico de Agrospec.

FITOTOXICIDAD

- No es fitotóxico en las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD

- No mezclar con productos de reacción ácida ni con productos que contengan polifosfatos. De preferencia, aplicar solo.

TIEMPO DE REINGRESO

- Sin restricciones.