

NUTRA BROTAION

Lote N°: Fecha fabric./Fecha venc.:

Mezcla de bioestimulante no microbiano con
fertilizante inorgánico compuesto por
macro y micronutrientes

Líquido en solución

Composición	% m/v
Materia seca (% m/m)	32,1
Extracto de <i>Ascophyllum nodosum</i>	9,0
Aminoácidos libres (L-α-aminoácidos)	7,0
Carbono (C)	6,4
Óxido de potasio (K ₂ O)	1,8
Zinc (Zn)	1,7
Óxido de magnesio (MgO)	1,5
Manganeso (Mn)	0,3
Contaminantes	ppm
Arsénico	< 0,5
Cadmio	< 0,5
Cobre	40
Cromo Cr	< 2
Mercurio	< 0,5
Níquel	< 10
Plomo	1
<i>Escherichia coli</i>	ausente
<i>Salmonella</i> sp.	ausente
Parámetros fisicoquímicos	
Densidad (a 20°C)	1,20 g/mL
pH (10% a 20°C)	5,7

Fabricado por

Agrospec®

Camino El Milagro 257, Maipú. Santiago, Chile.

agrospec.cl

Contenido neto:

Principales características

Bioestimulante y fertilizante inorgánico foliar, a base de algas, aminoácidos (L-α-aminoácidos) de origen vegetal y macro y micronutrientes. Está diseñado especialmente para estimular el período de brotación de frutales y vides, promoviendo el crecimiento de brotes y la actividad de la planta, incluso en condiciones de estrés abiótico (heladas y otras condiciones ambientales desfavorables). En plantas nuevas, promueve el crecimiento durante toda la temporada.

Nutra Brotación se absorbe rápida y fácilmente por hojas, tallos y brotes.

Corrige deficiencias de zinc.

Recomendaciones de uso vía foliar

Cultivo	Dosis*	Observaciones**
Almendro, avellano europeo, castaño, cerezo, ciruelo, damasco, duraznero, kiwi, manzano, membrillero, nectarino, nogal, peral, pistacho, vid de mesa, vid pisquera y vid vinífera.	3,5 - 5 L/ha	Aplicar desde brotes de 5 a 10 cm. Repetir si fuera necesario cada 7 a 10 días.
Clementino, limonero, mandarino, naranjo, olivo, palto, pomelo y tangelo.	4 - 5 L/ha	Aplicar al inicio de la brotación de otoño y primavera. Repetir si fuera necesario cada 7 a 10 días.
Arándano, cranberry, frambueso, frutilla, mora y zarzaparrilla.	3 - 4 L/ha	Aplicar en brotación, repitiendo si fuera necesario cada 7 a 10 días.
Acelga, achicoria, ají, ajo, apio, arveja, berenjena, brócoli, bunching, cebolla, chalota, ciboulette, coliflor, espinaca, garbanzo, haba, lechuga, lenteja, melón, papa, pepino, pepino dulce, pimentón, poroto, puerro, rábano, remolacha, repollito de brúselas, repollo, rúcula, sandía, tomate, zanahoria, zapallo y zapallo italiano.	2 - 4 L/ha	Aplicar desde 3 a 4 hojas. Repetir si fuera necesario cada 7 a 10 días.
Alfalfa, avena, cebada, maíz, oleaginosas, praderas, trigo y triticale.	2 - 4 L/ha	Aplicar desde 3 a 4 hojas. Repetir si fuera necesario, cada 7 a 10 días.
Huertos en formación, ornamentales y viveros.	2 - 4 L/ha	Aplicar desde brotación hasta mediados del verano cada 7 a 10 días, mientras se requiera estimular el crecimiento vegetativo.

*: **concentración referencial:** 400 - 500 cc/100L, en caso de mojamientos altos, respetar dosis máxima por ha.

****: aplicaciones por temporada:** normalmente 2 a 3, según las condiciones ambientales y del huerto.

Instrucciones de uso

Agregar al estanque del equipo aplicador a medio llenar, con el agitador funcionando y completar el estanque con agua.

Incompatibilidad y fitotoxicidad

- Es compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso común. En caso de dudas, efectuar pruebas de compatibilidad a pequeña escala.
- No es fitotóxico en las dosis recomendadas.

Precauciones

- Producto no tóxico, sin embargo, usar medidas de protección propias del manejo de un fitosanitario. Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas. Inutilizar los envases y eliminarlos de acuerdo con las instrucciones de las autoridades competentes. No transportar ni almacenar con alimentos. No lavar los envases o equipo de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua.
- Condiciones de almacenamiento: conservar el producto en una bodega seca, fresca y ventilada, protegido de la luz solar directa, en su envase original, bien cerrado y provisto de su etiqueta.