

NUTRA CONDICION

Lote N°: Fecha fabric./Fecha venc.:

Mezcla de bioestimulante no microbiano con
fertilizante inorgánico compuesto por
macro y micronutrientes

Líquido en solución

Composición	% m/v
Materia seca (% m/m)	20,0
Carbono (C)	9,7
Óxido de potasio (K ₂ O)	7,0
Extracto de <i>Ascophyllum nodosum</i>	5,0
Óxido de magnesio (MgO)	2,9
Óxido de calcio (CaO)	2,5
Boro (B)	0,6
Zinc (Zn)	0,006

Contaminantes	ppm
Arsénico	< 0,5
Cadmio	< 0,5
Cobre	< 10
Cromo VI	< 2
Mercurio	< 0,5
Níquel	< 10
Plomo	1,0
<i>Escherichia coli</i>	ausente
<i>Salmonella</i> sp.	ausente

Parámetros fisicoquímicos	
Densidad (a 20°C)	1,17 g/mL
pH (10% a 20°C)	5,4

Fabricado por

Agrospec®

Camino El Milagro 257, Maipú. Santiago, Chile.

agrospec.cl

Contenido neto:

Principales características

Bioestimulante y fertilizante inorgánico foliar, formulado sin adición de fuentes nitrogenadas, diseñado para lograr un crecimiento equilibrado de los frutos y mejorar su condición. En uva de mesa, se recomienda para minimizar la expresión de desórdenes fisiológicos.

Nutra Condición está formulado en base a *Ascophyllum nodosum* y nutrientes fundamentales como potasio, magnesio, calcio y boro, que promueven una buena condición de fruta. Corrige deficiencias de zinc.

Recomendaciones de uso vía foliar

Cultivo	Dosis	Observaciones
Vid de mesa, vid pisquera y vid vinífera.	8 - 10 L/ha	Para el control preventivo de palo negro, bayas acuosas y racimos débiles, aplicar desde bayas de 6 a 8 mm, una vez terminado el <i>shatter</i> . Aplicaciones por temporada: 2 a 4. Intervalo entre aplicaciones: 7 a 10 días.
	10 - 12 L/ha	Para el control curativo de palo negro, bayas acuosas y racimos débiles, aplicar desde que se observen los primeros síntomas. Aplicaciones por temporada: 2 a 4. Intervalo entre aplicaciones: 7 días.
Cerezo	8 - 10 L/ha	Aplicar en plena flor, repitiendo a los 7 y a los 14 días o desde fruto pajizo, cada 7 a 10 días, hasta precosecha.
Ciruelo, damasco, duraznero, kiwi, manzano, membrillero, nectarino y peral.	6 - 10 L/ha	Aplicar después del raleo. Aplicaciones por temporada: 2 a 4. Intervalo entre aplicaciones: 7 a 14 días.
Arándano, cranberry, frambueso, frutilla, mora y zarzaparrilla.	3 - 4 L/ha 400 - 500 cc/100 L	Aplicar desde postcuaaja. Realizar 2 a 3 aplicaciones cada 7 a 10 días durante el crecimiento de frutos.
Acelga, achicoria, ajo, apio, brócoli, bunching, cebolla, chalota, ciboulette, coliflor, espinaca, lechuga, papa, puerro, rábano, repollito de bruselas, repollo y rúcula.	2 - 5 L/ha 400 - 500 cc/100 L	Aplicar desde 3 a 4 hojas verdaderas. Realizar 2 a 4 aplicaciones cada 7 a 10 días durante el crecimiento de frutos.
Ají, berenjena, melón, pepino, pepino dulce, pimentón, sandía, tomate, zapallo y zapallo italiano.	2 - 5 L/ha 400 - 500 cc/100 L	Aplicar desde fruto cuajado. Aplicaciones por temporada: 4 máx. Intervalo entre aplicaciones: 7 a 10 días.

Instrucciones de uso

Agregar al estanque del equipo aplicador a medio llenar, con el agitador funcionando y completar el estanque con agua.

Incompatibilidad y fitotoxicidad

- Compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso común, a excepción de fosfitos. En caso de dudas, se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad a pequeña escala.
- No es fitotóxico en las dosis recomendadas.

Precauciones

- Producto no tóxico, sin embargo, usar medidas de protección propias del manejo de un fitosanitario. Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas. Inutilizar los envases y eliminarlos de acuerdo con las instrucciones de las autoridades competentes. No transportar ni almacenar con alimentos. No lavar los envases o equipo de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua.
- Condiciones de almacenamiento: conservar el producto en una bodega seca, fresca y ventilada, protegido de la luz solar directa, en su envase original, bien cerrado y provisto de su etiqueta.