

nutra brotación

NOMBRE COMUN	Nutra Brotación		
INGREDIENTE ACTIVO	<i>Ascophyllum nodosum</i> , aminoácidos libres, potasio, magnesio, manganeso y zinc.		
FORMULACION	Concentrado Soluble (SL)		
COMPOSICION	<i>Ascophyllum nodosum</i>	% p/v	% p/p
	Aminoácidos libres	9,0	7,4
	Potasio (K ₂ O)	7,0	5,8
	Magnesio (MgO)	1,8	1,5
	Zinc (Zn)	1,5	1,2
	Manganeso (Mn)	1,0	0,8
		0,3	0,2

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Nutra Brotación es un bioestimulante y fertilizante foliar, a base de *Ascophyllum nodosum*, aminoácidos (L-α-aminoácidos), macro y micronutrientes. Está formulado para estimular el período de brotación de frutales y vides, promoviendo el crecimiento de brotes y la actividad de la planta, incluso en condiciones de estrés abiótico, después de heladas y en otras condiciones ambientales desfavorables. En plantas nuevas, promueve el crecimiento durante toda la temporada.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Dosis		Observaciones*
	L/ha	cc/100 L	
Vid de mesa Vid pisquera Vid vinífera	3,5 - 5	350 - 500	Aplicar desde brotes de 5 a 10 cm, repitiendo si fuera necesario, cada 7 a 10 días. Realizar hasta 3 aplicaciones por temporada.
Clementino Limonero Mandarino Naranjo Paltó Pomelo	4 - 5	350 - 500	Aplicar al inicio de la brotación de otoño y primavera. Realizar hasta 3 aplicaciones por temporada.
Almendro Avellano europeo Cerezo Ciruelo Damasco Duraznero	3,5 - 5	350 - 500	Aplicar en brotación, repitiendo si fuera necesario, cada 7 a 10 días. Realizar hasta 3 aplicaciones por temporada.

Cultivo	Dosis		Observaciones*
	L/ha	cc/100 L	
Kiwi Manzano Nectarino Nogal Olivo Peral	3,5 - 5	350 - 500	Aplicar en brotación, repitiendo si fuera necesario, cada 7 a 10 días. Realizar hasta 3 aplicaciones por temporada.
Arándano Frambueso Frutilla	3 - 4	350 - 500	Aplicar en brotación, repitiendo si fuera necesario, cada 7 a 10 días. Realizar hasta 3 aplicaciones por temporada.
Pimentón Tomate	1 - 4	350 - 500	Aplicar desde el trasplante, repitiendo si fuera necesario, cada 7 a 10 días. Realizar hasta 3 aplicaciones por temporada.
Huertos en formación	1 - 4	350 - 500	Aplicar desde brotación hasta mediados del verano, cada 7 a 10 días, mientras se requiera estimular el crecimiento vegetativo.

El nº de aplicaciones (1 a 3 por temporada) dependerá de las condiciones ambientales y del huerto.

* : con mojamiento altos, respetar la dosis máxima por ha.

INSTRUCCIONES DE USO

Agregar al estanque del equipo aplicador a medio llenar, con el agitador funcionando. Completar el estanque con agua.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso común. En caso de dudas, se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad en pequeña escala.