



NOMBRE COMUN	Nutra Brotación	
INGREDIENTE ACTIVO	Ascophyllum nodosum, aminoácidos libres (L-α-aminoácidos), carbono, óxido de potasio, zinc, óxido de magnesio y manganeso.	
FORMULACION	Líquido en solución	
COMPOSICION		% m/v
	Extracto de Ascophyllum nodosum	9,0
	Aminoácidos libres (L-α-aminoácidos)	7,0
	Carbono (C)	6,4
	Óxido de potasio (K ₂ O)	1,8
	Zinc (Zn)	1,7
	Óxido de magnesio (MgO)	1,5
	Manganeso (Mn)	0,3

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Bioestimulante y fertilizante inorgánico foliar, a base de algas, aminoácidos (*L-α-aminoácidos*) de origen vegetal y macro y micronutriente, que se absorbe rápida y fácilmente por hojas, tallos y brotes. Está diseñado especialmente para estimular el período de brotación de frutales y vides, promoviendo el crecimiento de brotes y la actividad de la planta, incluso en condiciones de estrés abiótico (heladas y otras condiciones ambientales desfavorables). En plantas nuevas, promueve el crecimiento durante toda la temporada. Corrige deficiencias de zinc.

RECOMENDACIONES DE USO

Vía foliar

Cultivo	Dosis*	Observaciones
Almendro, avellano europeo, castaño, cerezo, ciruelo, damasco, duraznero, kiwi, manzano, membrillero, nectarino, nogal, peral, pistacho, vid de mesa, vid pisquera y vid vinífera.	3,5 - 5 L/ha	Aplicar desde brotes de 5 a 10 cm. Repetir si fuera necesario cada 7 a 10 días.
Clementino, limonero, mandarino, naranjo, olivo, palto, pomelo y tangelo.	4 - 5 L/ha	Aplicar al inicio de la brotación de otoño y primavera. Repetir si fuera necesario cada 7 a 10 días.
Arándano, cranberry, frambueso, frutilla, mora y zarzaparrilla.	3 - 4 L/ha	Aplicar en brotación, repitiendo si fuera necesario cada 7 a 10 días.

Cultivo	Dosis*	Observaciones
Acelga, achicoria, ají, ajo, apio, arveja, berenjena, brócoli, bunching, cebolla, chalota, ciboulette, coliflor, espinaca, garbanzo, haba, lechuga, lenteja, melón, papa, pepino, pepino dulce, pimentón, poroto, puerro, rábano, remolacha, repollito de bruselas, repollo, rúcula, sandía, tomate, zanahoria, zapallo y zapallo italiano.	2 - 4 L/ha	Aplicar desde 3 a 4 hojas. Repetir si fuera necesario cada 7 a 10 días.
Alfalfa, avena, cebada, maíz, oleaginosas, praderas, trigo y triticale	2 - 4 L/ha	Aplicar desde 3 a 4 hojas. Repetir si fuera necesario, cada 7 a 10 días.
Huertos en formación, ornamentales y viveros.	2 - 4 L/ha	Aplicar desde brotación hasta mediados del verano cada 7 a 10 días, mientras se requiera estimular el crecimiento vegetativo.

* concentración referencial: 400 - 500 cc/100L. Con mojamientos altos, respetar la dosis máxima por ha.
Aplicaciones por temporada: normalmente 2 a 3, según las condiciones ambientales y del huerto.

INSTRUCCIONES DE USO

Agregar al estanque del equipo aplicador a medio llenar, con el agitador funcionando y completar el estanque con agua.

INCOMPATIBILIDAD

- Es compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso común. En caso de dudas, efectuar pruebas de compatibilidad a pequeña escala.
- No es fitotóxico en las dosis recomendadas.