



NOMBRE COMUN	Nutra Condición	
INGREDIENTE ACTIVO	Carbono, potasio, extracto de <i>Ascophyllum nodosum</i> magnesio, calcio, boro y zinc.	
FORMULACION	Líquido en solución	
COMPOSICION		% m/v
	Carbono (C)	9,7
	Óxido de potasio (K ₂ O)	7,0
	Extracto de <i>Ascophyllum nodosum</i>	5,0
	Óxido de magnesio (MgO)	2,9
	Óxido de cálcio (CaO)	2,5
	Boro (B)	0,6
	Zinc (Zn)	0,006

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Bioestimulante y fertilizante inorgánico foliar, formulado sin adición de fuentes nitrogenadas, diseñado para lograr un crecimiento equilibrado de los frutos y mejorar su condición.

En uva de mesa, se recomienda para minimizar la expresión de desórdenes fisiológicos.

Nutra Condición está formulado en base a *Ascophyllum nodosum* y nutrientes fundamentales como potasio, magnesio, calcio y boro, que promueven una buena condición de fruta.

Corrige deficiencias de zinc.

RECOMENDACIONES DE USO

Vía foliar

Cultivo	Dosis	Observaciones
Vid de mesa, vid pisquera y vid vinífera.	8 - 10 L/ha	Para el control preventivo de palo negro, bayas acuosas y racimos débiles, aplicar desde bayas de 6 a 8 mm, una vez terminado el <i>shatter</i> . Aplicaciones por temporada: 2 a 4. Intervalo entre aplicaciones: 7 a 10 días.
	10 - 12 L/ha	Para el control curativo de palo negro, bayas acuosas y racimos débiles, aplicar desde que se observen los primeros síntomas. Aplicaciones por temporada: 2 a 4. Intervalo entre aplicaciones: 7 días.
Cerezo	8 - 10 L/ha	Aplicar en plena flor, repitiendo a los 7 y a los 14 días o desde fruto pajizo, cada 7 a 10 días, hasta precosecha.
Ciruelo, damasco, duraznero, kiwi, manzano, membrillero, nectarino y peral.	6 - 10 L/ha	Aplicar después del raleo. Aplicaciones por temporada: 2 a 4. Intervalo entre aplicaciones: 7 a 14 días.

Cultivo	Dosis	Observaciones
Arándano, cranberry, frambueso, frutilla, mora y zarzaparrilla.	3 - 4 L/ha 400 - 500 cc/100 L	Aplicar desde post cuaja. Realizar 2 a 3 aplicaciones cada 7 a 10 días durante el crecimiento de frutos.
Acelga, achicoria, ajo, apio, brócoli, bunching, cebolla, chalota, ciboulette, coliflor, espinaca, lechuga, papa, puerro, rábano, repollito de bruselas, repollo y rúcula.	2 - 5 L/ha 400 - 500 cc/100 L	Aplicar desde 3 a 4 hojas verdaderas. Realizar 2 a 4 aplicaciones cada 7 a 10 días durante el crecimiento de frutos.
Ají, berenjena, melón, pepino, pepino dulce, pimentón, sandía, tomate, zapallo y zapallo italiano.	2 - 5 L/ha 400 - 500 cc/100 L	Aplicar desde fruto cuajado. Aplicaciones por temporada: 4 máx. Intervalo entre aplicaciones: 7 a 10 días.

INSTRUCCIONES DE USO

Agregar al estanque del equipo aplicador a medio llenar, con el agitador funcionando y completar el estanque con agua.

INCOMPATIBILIDAD

- Compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso común, a excepción de fosfitos. En caso de dudas, se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad a pequeña escala.
- No es fitotóxico en las dosis recomendadas.