



NOMBRE COMUN	Maxgreen		
INGREDIENTE ACTIVO	Boro + Zinc		
FORMULACION	Concentrado Emulsionable (EC)		
COMPOSICION	Boro (B) Zinc (Zn)	% p/v 2,03 5,11	% p/p 1,68 4,22

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Maxgreen es un fertilizante foliar que aporta boro y zinc, nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas. Promueve el movimiento de azúcares y nutrientes desde las hojas hacia los puntos de fructificación, asegurando el llenado de frutos y reducción de su caída prematura.

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicación foliar:

Cultivo	Dosis	Observaciones
Arándano Frambueso Frutilla	250 - 300 cc/100 L	Aplicar desde inicio de pinta a cosecha, cada 7 días. Mojamiento sugerido: 600 - 1.000 L/ha.
Cerezo Ciruelo Duraznero Nectarino	250 - 300 cc/100 L	Aplicar desde inicio de pinta a cosecha, cada 7 días. Mojamiento sugerido: 1.500 - 2.000 L/ha.
Uva de mesa	250 - 300 cc/100 L	Aplicar en precosecha, cada 5 a 7 días. Mojamiento sugerido: 800 a 1.000 L/ha con equipos convencionales.

INSTRUCCIONES DE USO

- Se sugiere realizar un máximo de 4 aplicaciones por cultivo por temporada.
- Agitar enérgicamente antes de abrir el envase.
- Considerar un volumen de agua y tamaño de gota que permitan un buen cubrimiento, sin escurrimiento.
- Aplicar con equipos correctamente calibrados y con gota fina.
- Llenar con agua el estanque hasta la mitad del volumen requerido. Con el agitador funcionando, agregar la cantidad requerida de **Maxgreen** y completar el volumen de agua. Aplicar inmediatamente.

PRECAUCIONES DE USO

El escurrimiento, uso de gota gruesa o sobredosis de producto pueden generar depósitos visibles o *russel* en bayas y frutos.

COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común, sin embargo, se sugiere hacer pruebas de compatibilidad previas.