



NOMBRE COMUN	Topgreen		
INGREDIENTE ACTIVO	Cobre + Manganeso + Zinc		
FORMULACION	Concentrado Emulsionable (EC)		
COMPOSICION	Cobre (Cu) Manganeso (Mn) Zinc (Zn)	% p/v 2,42 1,58 1,91	% p/p 2,01 1,31 1,59

## PRINCIPALES CARACTERISTICAS

**Topgreen** es un fertilizante foliar líquido que aporta cobre, manganeso y zinc, nutrientes que intervienen en los procesos de formación de clorofila y fotosíntesis de las plantas. Favorece la calidad y condición de los frutos.

## RECOMENDACIONES DE USO

### Aplicación foliar:

Cultivo	Dosis	Observaciones
Vid de mesa Vid pisquera Vid vinífera	250 - 300 cc/100 L	Aplicar en floración, previo al cierre de racimo y de pinta a pre-cosecha, cada 7 días. Mojamiento sugerido de floración a cierre de racimo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parronal: 1.000 - 1.500 L/ha.</li> <li>• Espaldera: 400 - 800 L/ha.</li> </ul> Mojamiento sugerido desde pinta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parronal: 700 - 1.000 L/ha.</li> <li>• Espaldera: 600 - 1.000 L/ha.</li> </ul>
Arándano Frambueso Frutilla	250 cc/100 L	Aplicar desde inicio de floración a pre-cosecha, cada 7 días. Mojamiento sugerido: 400 - 800 L/ha.

## INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar energicamente antes de abrir el envase.
- Considerar un volumen de agua y tamaño de gota que permitan un buen cubrimiento, sin escurrimiento.
- Aplicar con equipos correctamente calibrados y con gota fina.
- Llenar con agua el estanque hasta la mitad del volumen requerido. Con el agitador funcionando, agregar la cantidad requerida de **Topgreen** y completar el volumen de agua. Aplicar inmediatamente.

## PRECAUCIONES DE USO

El escurrimiento, uso de gota gruesa o sobredosis de producto pueden generar depósitos visibles o *russet* en frutos.

## COMPATIBILIDAD

Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común, sin embargo, se sugiere hacer pruebas de compatibilidad previas.

## INCOMPATIBILIDAD

No mezclar con sulfato de cobre pentahidratado.