



NOMBRE COMUN	Ascophyllum Grow•480 SL	
INGREDIENTE ACTIVO	Extracto de <i>Ascophyllum nodosum</i>	
FORMULACION	Líquido en solución	
COMPOSICION	Extracto de <i>Ascophyllum nodosum</i> Carbono (C)	% m/v 48,0 14,7

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Ascophyllum Grow•480 SL es un bioestimulante de uso foliar y para fertirriego, formulado a base de extracto concentrado de *Ascophyllum nodosum*, que aporta un 25,2% m/v de materia orgánica. Su aplicación estimula el crecimiento de brotes, promueve una buena floración y una cuaja equilibrada, favorece el crecimiento de frutos y mejora la producción y el rendimiento. Además, favorece la adaptación del cultivo frente a condiciones adversas, aumentando su tolerancia a temperaturas extremas, estrés hídrico o salinidad.

RECOMENDACIONES DE USO

Vía foliar

Cultivo	Dosis*	Observaciones***
Vid de mesa, vid pisquera y vid vinífera.	1 - 1,5 L/ha	Aplicar desde brotes de 5 cm hasta floración, en cuaja, crecimiento de bayas y en momentos de estrés abiótico.
Almendro, cerezo, ciruelo, duraznero y nectarino.	1 - 1,5 L/ha	Aplicar en floración, caída de pétalos, crecimiento de frutos y quiebre de color. Para minimizar el estrés térmico, realizar 1 a 3 aplicaciones en postcosecha.
Avellano europeo, manzano, membrillero y peral.	1 - 1,5 L/ha	Aplicar periódicamente para mejorar los procesos de brotación, floración, cuaja, crecimiento de frutos y todos los procesos fisiológicos de las planta en general. Mantener las aplicaciones en verano, para reducir los efectos negativos del estrés térmico.

Cultivo	Dosis*	Observaciones
Kiwi	1 - 1,5 L/ha	Aplicar en brotación y floración. Repetir en fruto recién cuajado y 14 días después. Si los frutos tienen presencia de polvo, preferir aplicaciones vía fertirriego.
Arándano, cranberry frambueso, frutilla, mora y zarzaparrilla.	0,75 - 1,25 L/ha	Aplicar en floración, cuaja, crecimiento de frutos y en postcosecha temprana.
Castaña, nogal y pistacho.	1 - 2 L/ha	Aplicar desde el inicio de floración hasta el endurecimiento de la cáscara. En verano, para minimizar estrés térmico.
Clementino, limonero, mandarino, naranjo, olivo, palto, pomelo y tangelo.	1 - 2 L/ha	Aplicar en brotación, floración, cuaja y crecimiento de frutos. En verano, para reducir estrés térmico.
Betarraga, papa, remolacha y zanahoria.	0,5 - 1 L/ha	Aplicar postrasplante y mantener aplicaciones regulares cada 15 días, durante todo el desarrollo del cultivo.
Acelga, achicoria, apio, espinaca y lechuga.		
Ají, berenjena, pimentón y tomate.		
Melón, pepino, sandía zapallo y zapallo italiano.		
Ajo, bunching, cebolla, chalota, ciboulette y puerro.	1 - 1,5 L/ha	
Brócoli, coliflor, repollito de bruselas, repollo, rabanito, rábano y rúcula.	0,5 - 1 L/ha	
Avena, cebada, leguminosas de grano, maíz, oleaginosas, trigo y triticale.	0,5 - 1 L/ha	Aplicar con 3 a 4 hojas, floración, crecimiento de vaina y llenado de granos.
Alfafa y praderas	0,5 - 1 L/ha	Aplicar con 6 a 10 cm y repetir 7 a 10 días después del corte.
Ornamentales	0,5 - 1 L/ha	Aplicar durante el ciclo del cultivo.
Huertos en formación y viveros	125 - 150 cc/100 L	Aplicar durante el crecimiento vegetativo y bajo situaciones de estrés.

*: 100 - 150 cc/100 L para todos los cultivos. Con altos y bajos volúmenes de agua, mantener la dosis/ha.

Carozos y arándanos: en caso de no querer favorecer una mayor cuaja, aplicar desde caída de pétalos.

Intervalo entre aplicaciones: 7 a 30 días para todos los cultivos y arándanos:

RECOMENDACIONES DE USO

Vía fertirriego

- Aplicar 1,5 - 3 L/ha, dependiendo de la edad y vigor del huerto.

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar bien el envase antes de aplicar.
- No exceder la dosis máxima indicada (L/ha).
- En aplicaciones vía fertirriego, inyectar en la última etapa del riego, de manera de dejar el producto en la zona de mayor crecimiento de raíces.

INCOMPATIBILIDAD

- Compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso común, excepto con los de marcada reacción alcalina. En caso de dudas, efectuar pruebas de compatibilidad a pequeña escala.
- No es fitotóxico en las dosis recomendadas, sin embargo, en algunas variedades de carozos y pomáceas sensibles a aplicaciones foliares, se recomienda hacer pruebas a pequeña escala.