PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo químico: boscalid pertenece al grupo químico de las piridincarboxamidas y fludioxonil pertenece al grupo químico de los fenilpirroles.
Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel, nunca manipular sin contar con los elementos de seguridad mínimos. La manipulación del producto sólo debe ser realizada por personas adultas y entrenadas en su manejo. No comer, beber ni fumar durante la manipulación y aplicación del producto.

Equipo de protección personal durante la preparación y aplicación: usar overol impermeable, antiparras, máscara con filtro, botas de goma impermeables y guantes impermeables. No aplicar en contra del viento y una vez terminada la aplicación cámbiese toda la ropa y lávese con abundante agua limpia de la llave. No contaminar fuentes ni cursos de agua, alimentos ni pastos. Conservar el producto en una bodega con llave, seca, fresca y ventilada, en su envase original, bien cerrado y provisto con su etiqueta. No almacenar junto a alimentos, semillas ni forrajes.

Información ecotoxicológica: a la dosis de aplicación recomendada, **Sublime 425 SC**, es prácticamente no tóxico para aves, **VIRTUALMENTE NO TÓXICO PARA ABEJAS**, ligeramente tóxico para lombrices, moderadamente tóxico para dafnias y peces, y altamente tóxico para algas.

Instrucciones para el triple lavado: realizar triple lavado de los envases. Agregar agua al envase hasta un cuarto de su capacidad, agitar durante 30 segundos y verter en la máquina pulverizadora. Repetir tres veces. Perforar el envase y eliminarlo de acuerdo con las disposiciones de la autoridad competente. Almacenar los envases en algún lugar destinado sólo para su acopio , dentro del predio. Posteriormente, enviar los envases a un centro de acopio y chipeado de envases vacíos, dispuesto por la autoridad local. No enterrar ni utilizar con otros fines. Eliminar en vertederos autorizados, de acuerdo con la normativa local vigente.

Síntomas de intoxicación: disnea, mareos, diarrea y náuseas.

Antídoto: no existe antídoto específico.

Tratamiento médico de emergencia: realizar tratamiento sintomático.

Primeros auxilios:
En caso de inhalación: trasladar al afectado al aire fresco. Si el afectado no respira, dar respiración artificial con máscara de respiración artificial.

En caso de contacto cutáneo: retirar la ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla.

En caso de contacto ocular: lavar los ojos con abundante agua limpia por 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si la persona usa lentes de contacto lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 ó 20 minutos. No volver a utilizar los lentes de contacto.

En caso de ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca administrar nada por la boca a una persona inconsciente.

En todos los casos, trasladar al afectado inmediatamente a un Centro Asistencial. Llevar la etiqueta o el envase del producto.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

LA ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO DE REINGRESO.

GUARDAR EN LUGAR FRESCO Y SECO.

En caso de intoxicación llamar:
Centro de Información Toxicológica UC (CITUC):
56 2 2635 3800 (24 horas)
Agrospec S.A.: 56 2 2836 8000

v30052025

SUBLIME® 425 SC

Fungicida
Suspensión Concentrada (SC)

Sublime 425 SC es un fungicida de contacto, sistémico y translaminar, con acción preventiva y curativa. Se recomienda para el control de botritis en vides, ajo, cebolla y chalota y oído en vides.

COMPOSICIÓN:

Ingrediente Activo:

Boscalid*	30% p/v (26,39% p/p ≈ 300 g/L)
Fludioxonilo**	12,5% p/v (11% p/p ≈ 125 g/L)
Coformulantes c.s.p.	100% p/p (1159 g/L)

*2-cloro-*N*-(4'-clorobifenil-2-il) nicotinamida
** 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-il) pirrol-3-carbonitrilo

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero Nº 20043

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Lote Nº:

Cont. Neto: L **Fecha Venc.:**

Fabricado y distribuido por:

agrospec®

Camino El Milagro 257 - Maipú, Santiago, Chile
Teléfono: 56 2 2836 8000
agrospec.cl

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

INSTRUCCIONES DE USO

Descripción: Sublime 425 SC es un fungicida de contacto, sistémico y de acción translaminar, con acción preventiva y curativa, que actúa inhibiendo el metabolismo celular de los hongos. Se recomienda para el control de botritis y oído en vides y otros cultivos.

Cuadro de instrucciones de uso:

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones	Carencia (días)
Vid de mesa Vid pisquera Vid vinífera	Botritis (*Botrytis cinerea*)	2 L/ha	Aplicar en pinta y durante precosecha, con condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad. Aplicaciones por temporada: 3 máx. Intervalo entre aplicaciones: 14 días máx., según condiciones ambientales. Mojamiento sugerido: 1.000 L/ha.	1
	Oídio (*Erysiphe necator*)		Aplicar desde preflor en adelante, con condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad. Aplicaciones por temporada: 4 máx. Intervalo entre aplicaciones: 14 días máx., según condiciones ambientales. Mojamiento sugerido: 1.000 - 1.100 L/ha.	
Ajo Cebolla Chalota	Botritis (*Botrytis cinerea*)	0,75 - 2 L/ha	Aplicar con condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad. Usar la dosis mayor con alta presión de la enfermedad y la dosis menor con media a baja presión de la enfermedad. Aplicaciones por temporada: 3 máx. Intervalo entre aplicaciones: 10 días. Mojamiento sugerido: 200 - 600 L/ha.	

Equipo de aplicación: aspersión o nebulizadores.

Preparación de la mezcla: llenar el estanque del equipo aplicador hasta la mitad con agua, agregar la cantidad requerida de **Sublime 425 SC** a través del filtro y luego completar con agua hasta el volumen deseado, manteniendo agitación constante.

Precauciones:
- Evitar aplicar con temperaturas iguales o superiores a 28ºC y no aplicar con viento excesivo de más de 8 km/hora.
- No aplicar en condiciones de estrés, tales como sequía, heladas y otras.
- Se debe aplicar sin agua libre en la superficie del follaje, por lo que es recomendable no aplicar si el riesgo de lluvia es inminente.
- Para reducir el riesgo de desarrollo de resistencia o de poblaciones menos sensibles, se recomienda la aplicación de forma alternada con otro fungicida de diferente grupo químico o modo de acción, considerando que según código FRAC, boscalid pertenece al grupo 7 y fludioxonil pertenece al grupo 12.

Fitotoxicidad: no es fitotóxico en las especies recomendadas, si se utiliza de acuerdo con la forma y dosis que se indican.

Compatibilidad: es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. En caso de mezclas no conocidas, se recomienda realizar pruebas de compatibilidad en pequeña escala.

Incompatibilidad: no se registraron incompatibilidades en pruebas específicas realizadas.

Tiempo de reingreso al área tratada: como resguardo para el ingreso de personas, ingresar al área tratada después de 4 horas de la aplicación. Previamente, verificar que la aspersión se haya secado sobre la superficie de los cultivos tratados. Para animales no corresponde indicar tiempo de reingreso al área tratada, por tratarse de cultivos cuya producción no está destinada a la alimentación animal.

Nota del fabricante: el fabricante certifica que este producto ha sido preparado en conformidad a lo especificado en la etiqueta, y garantiza una protección contra las enfermedades para las cuales es recomendado, siguiendo las instrucciones de uso. Este producto se expende dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.

* marca registrada de Agrospec S.A.

CUIDADO

USO EXCLUSIVO AG