



| NOMBRE COMUN | Frutfit®                      |       |       |
|--------------|-------------------------------|-------|-------|
| CATEGORIA    | Activador fisiológico vegetal |       |       |
| FORMULACION  | Concentrado soluble (SL)      |       |       |
| COMPOSICION  |                               | % p/v | % p/p |
|              | Ácido indolbutírico           | 0,009 | 0,009 |
|              | Ácido indolacético            | 0,006 | 0,006 |
|              | Ácido giberélico              | 0,003 | 0,003 |
|              | Citoquinina                   | 0,026 | 0,025 |

## PRINCIPALES CARACTERISTICAS

**Frutfit** favorece la activación y regulación de procesos fisiológicos y metabólicos propios de las plantas, mejorando su eficiencia funcional y capacidad de respuesta frente a condiciones de estrés abiótico. Frutfit mejora la eficiencia de absorción y el transporte interno de nutrientes.

## RECOMENDACIONES DE USO

### Aplicación foliar

| Cultivo                                                             | Dosis (L/ha) | Observaciones                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vid de mesa                                                         | 1 - 1,5      | Aplicar junto al ácido giberélico de crecimiento. Repetir, si fuera necesario.                                                                                                                                  |
| Cerezo                                                              | 1 - 1,5      | Aplicar desde estado de <i>balón</i> . Repetir, si fuera necesario, cada 7 días con un máximo de 4 aplicaciones por temporada.                                                                                  |
| Almendro<br>Ciruelo<br>Duraznero<br>Nectarino                       | 0,5 - 1      | Aplicar en caída de pétalos/chaqueta. Repetir, si fuera necesario, cada 7 días con un máximo de 3 aplicaciones por temporada.                                                                                   |
| Manzano<br>Membrillero<br>Peral                                     |              |                                                                                                                                                                                                                 |
| Clementino<br>Limonero<br>Mandarino<br>Naranja<br>Pomelo<br>Tangelo | 1 - 1,5      | Aplicar desde fruto recién cuajado. Repetir cada 14 a 21 días. En caso de aplicar en post-caída fisiológica, usar intervalos entre aplicaciones de 30 días. Realizar un máximo de 3 aplicaciones por temporada. |

| Cultivo                | Dosis (L/ha) | Observaciones                                                                                                 |
|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arándano<br>Frutilla   | 0,5 - 1      | Aplicar en floración. Repetir, si fuera necesario, cada 7 días con un máximo de 4 aplicaciones por temporada. |
| Nogal                  | 0,5 - 1      | Aplicar en fruto recién cuajado. Repetir cada 7 a 14 días con un máximo de 3 aplicaciones por temporada.      |
| Kiwi                   | 0,5          | Aplicar en fruto recién cuajado. Repetir a los 10 días, si fuera necesario.                                   |
| Palto                  | 1 - 1,5      | Aplicar en floración, cuaja e inicio de crecimiento de frutos.                                                |
| Avellano europeo       | 0,5 - 1      | Aplicar en floración, cuaja e inicio de crecimiento de frutos.                                                |
| Maíz para ensilaje     | 0,5          | Aplicar durante estadios V3 a V6.                                                                             |
| Cultivos<br>Hortalizas | 0,25 - 1     | Aplicar en estado de 4 a 5 hojas. Repetir, si fuera necesario, a los 7 a 14 días.                             |

INSTRUCCIONES DE USO

Verter **Frutfit** en el estanque a medio llenar con el agitador en marcha y luego completar el volumen de agua requerido. Aplicar con agitación constante.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD

**Frutfit**, es compatible con la mayoría de los fitosanitario de uso común. En caso de dudas, se recomienda efectuar pruebas de mezcla para comprobar compatibilidad.

® marca registrada de Agrospec S.A.