



NOMBRE COMUN	Frutfit®		
CATEGORIA	Bioestimulante de acción hormonal.		
FORMULACION	Concentrado soluble (SL)		
COMPOSICION		% p/v	% p/p
	Ácido indolbutírico	0,009	0,009
	Ácido indolacético	0,006	0,006
	Ácido giberélico	0,003	0,003
	Citoquinina	0,026	0,025

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Frutfit es un bioestimulante líquido, de aplicación foliar, que estimula los procesos naturales de las plantas, promueve el crecimiento de los frutos y mejora el rendimiento de los cultivos. Su uso también favorece los procesos fisiológicos y metabólicos de las plantas.

RECOMENDACIONES DE USO

Aplicación foliar

Cultivo	Dosis (L/ha)	Observaciones
Vid de mesa	1 - 1,5	Aplicar junto al ácido giberélico de crecimiento. Repetir, si fuera necesario.
Cerezo	1 - 1,5	Aplicar desde estado de <i>balón</i> . Repetir, si fuera necesario, cada 7 días con un máximo de 4 aplicaciones por temporada.
Almendro Ciruelo Duraznero Nectarino	0,5 - 1	Aplicar en caída de pétalos/chaqueta. Repetir, si fuera necesario, cada 7 días con un máximo de 3 aplicaciones por temporada.
Manzano Membrillero Peral		
Clementino Limonero Mandarino Naranja Pomelo Tangelo	1 - 1,5	Aplicar desde fruto recién cuajado. Repetir cada 14 a 21 días. En caso de aplicar en post-caída fisiológica, usar intervalos entre aplicaciones de 30 días. Realizar un máximo de 3 aplicaciones por temporada.

Cultivo	Dosis (L/ha)	Observaciones
Arándano Frutilla	0,5 - 1	Aplicar en floración. Repetir, si fuera necesario, cada 7 días con un máximo de 4 aplicaciones por temporada.
Nogal	0,5 - 1	Aplicar en fruto recién cuajado. Repetir cada 7 a 14 días con un máximo de 3 aplicaciones por temporada.
Kiwi	0,5	Aplicar en fruto recién cuajado. Repetir a los 10 días, si fuera necesario.
Palto	1 - 1,5	Aplicar en floración, cuaja e inicio de crecimiento de frutos.
Avellano europeo	0,5 - 1	Aplicar en floración, cuaja e inicio de crecimiento de frutos.
Maíz para ensilaje	0,5	Aplicar durante estadios V3 a V6.
Cultivos Hortalizas	0,25 - 1	Aplicar en estado de 4 a 5 hojas. Repetir, si fuera necesario, a los 7 a 14 días.

INSTRUCCIONES DE USO

Verter **Frutfit** en el estanque a medio llenar con el agitador en marcha y luego completar el volumen de agua requerido. Aplicar con agitación constante.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD

Frutfit, es compatible con la mayoría de los fitosanitario de uso común. En caso de dudas, se recomienda efectuar pruebas de mezcla para comprobar compatibilidad.

® marca registrada de Agrospec S.A.