

Serán historia

sierpes, brotes basales y malezas



carfentrazon^{400 EC}

Sierpes, brotes basales y malezas de hoja ancha no alcanzarán a reaccionar.

Carfentrazon 400 EC trabaja con toda la eficacia que tus cultivos necesitan.

Es momento de actuar, sin pagar de más.

carfentrazon^{400 EC}

Agrospec presenta **Carfentrazon 400 EC**, herbicida multiuso, recomendado para el control de sierpes, brotes basales, chupones y malezas de hoja ancha, en una amplia gama de frutales. También se recomienda como desecante en papa.

El desempeño que tu cultivo necesita

- Gran control de sierpes y brotes basales.
- Eficaz control de malezas de hoja ancha.
- ★ Máximo rendimiento al mejor costo.

Así actúa Carfentrazon 400 EC

Su ingrediente activo, carfentrazona-etilo, actúa por contacto, provocando la destrucción de las membranas celulares, necrosis y finalmente desecación de los tejidos tratados.

Carfentrazona-etilo se absorbe rápidamente, por lo que no es lavado por lluvias que ocurran pocas horas después de su aplicación. Solo actúa en la superficie tratada, no se transloca al resto de la planta.

Serán historia
sierpes, brotes basales y malezas



Sierpes de avellano europeo
antes de aplicar.



Carfentrazon 400 EC (67 cc/100 L),
9 días después de aplicado.



Sierpes de avellano europeo
antes de aplicar.



Carfentrazon 400 EC (67 cc/100 L),
15 días después de aplicado.

Presentación

Carfentrazon 400 EC
se encuentra disponible en
envases de 1 litro.



Eficacia comprobada




Sierpes antes de aplicar.



Carfentrazon 400 EC (40 cc/100 L),
15 días después de aplicado.

Eficacia de **Carfentrazon 400 EC** en el control de **sierpes**
de avellano europeo var. Tonda di Giffoni, Región de Maule, 2025-26.




Aplicaciones: 01.10.25, 29.10.25, 24.11.25 y 07.01.26

Fuente: Convenio Agroteyes - Agrospec

En el gráfico se observa que **Carfentrazon 400 EC**, en ambas dosis, muestra una alta eficacia en el control de sierpes, aun cuando la cantidad inicial de sierpes fue más alta que la de los otros tratamientos.




Eficacia de **Carfentrazon 400 EC** en el control de **brotos basales**
de vid vinífera, var. Cabernet Sauvignon, Región Metropolitana, 2025-26.



Aplicación: 22.10.25

Fuente: Convenio U. de Chile - Agrospec

Eficacia de **Carfentrazon 400 EC** en el control de **sierpes** de ciruelo japonés, Región Metropolitana, 2025-26.




Aplicación: 24.09.25

Fuente: Convenio U. de Chile - Agrospec



Carfentrazon 400 EC,
7 días después de aplicado.

Eficacia de **Carfentrazon 400 EC** en el control de **sierpes** de cerezo var. Santina, Región de O'Higgins, 2025-26.



Escala: 0= sin daño, 5= 90 a 99% del área foliar de sierpe dañada.

Aplicación: 08.01.25

Fuente: Agrospec

dda: días después de aplicado.

Letras iguales, en la misma fecha de evaluación (mismo color de barra), indican que los tratamientos no presentan diferencia estadística ($p < 0,05$).



Carfentrazon 400 EC,
19 días después de aplicado.

Recomendaciones de uso

Control de sierpes, brotes y chupones

Cultivo	Tamaño	Dosis
Avellano europeo	hasta 20 cm	40 cc/100 L
	hasta 50 cm	80 cc/100 L
Almendro · Cerezo · Ciruelo Damasco · Duraznero · Guindo Manzano · Membrillero Nectarino · Peral	hasta 15 cm	50 cc/100 L
	hasta 50 cm	65 cc/100 L
Arándano · Cranberry Frambueso · Granado Grosellero · Mora · Zarzaparrilla	hasta 20 cm	60 cc/100 L
	hasta 50 cm	80 cc/100 L
Clementino · Chirimoyo · Kiwi Limonero · Lúcumo · Mandarin Mango · Naranja · Nogal · Olivo Palto · Pecano · Pistacho Pomelo · Tangelo	hasta 20 cm	60 cc/100 L
	hasta 50 cm	80 cc/100 L
Vid de mesa · Vid vinífera	hasta 15 cm	50 cc/100 L
	hasta 80 cm	65 cc/100 L

Control postemergente de malezas de hoja ancha

Cultivo	Dosis
Frutales	60 - 80 cc/ha

Desecante

Cultivo	Dosis
Papa	200 cc/ha

Esta información es de carácter referencial, lea siempre la etiqueta del producto.

Consejos para un óptimo resultado

- Para minimizar el riesgo de volatilización, aplicar con temperatura menor a 25°C. No aplicar si se esperan temperaturas mayores a 25°C en las 4 a 6 horas posteriores a la aplicación. Considerar que la presión de vapor de un producto crece con el aumento de la temperatura ambiente, por lo que el riesgo de volatilización sobre 25°C será mayor.
- Aplicar temprano en la temporada o sobre sierpes y brotes tiernos.
- Asegurar un buen cubrimiento de los tejidos tratados.
- Para evitar o minimizar la deriva del herbicida, se recomienda:
 - No aplicar con viento mayor a 4 km/hora.
 - Aplicar a una velocidad máxima de 4 km/hora.
 - Mezclar con aceite mineral al 0,5 %.
 - Utilizar boquillas anti deriva.

Asegurando la calidad de nuestros productos

Nuestro foco es entregar productos de calidad, efectivos y confiables:

- Monitoreamos el proceso completo, desde las materias primas hasta el producto formulado.
- Validamos el activo, su contenido y descartamos la presencia de residuos no deseados en los productos formulados.



Serán historia

sierpes, brotes basales y malezas



carfentrazon^{400 EC}

Atacama y Coquimbo	9 7432 2831	ccaceres@agrospec.cl
Valparaíso	9 4239 1764	mmardones@gmtchile.cl
Metropolitana	9 7476 7307	azapata@agrospec.cl
O'Higgins	9 9549 4179 (norte) 9 9236 7677 (sur)	iureta@agrospec.cl lzuniga@agrospec.cl
Maule	9 3954 5701	mduarte@agrospec.cl
Bío-Bío	9 9824 6181	pbaherle@agrospec.cl



agrospec.cl



@ marca registrada de Agrospec S. A.

07/26

Agrospec